

Beatrice Bramucci
Capogruppo
Circolo Fotografico AVIS Chiaravalle BFI

Capolinea=Cimitero.

Questa è l'associazione che mi è venuta spontanea quando ho sentito parlare per la prima volta del progetto. Leggendo però i vari commenti ai vari post, ho convenuto che da un capolinea si parte anche, non è solo un luogo di arrivo. Poi, presso il circolo, c'è stata la serata di presentazione del tema con Giancarla.

Lì, ho avuto tutto ben chiaro. Dovevo cercare il mio capolinea!

La vita di ciascuno è scandita da tappe, più o meno piacevoli, più o meno significative, ma pur sempre tappe. Momenti in cui la vita ha una svolta: un matrimonio, una separazione, la nascita di un figlio, un intervento chirurgico, la perdita di una persona cara Tutti momenti importanti, tutti capolinea che segnano un punto fisso sulla linea della vita di ciascuno. Momenti che aspetti con trepidazione o che vorresti non arrivassero mai. Momenti dai quali devi ripartire.

E il mio Capolinea?

Da poco ho avuto un problema agli occhi, niente di grave, ma in seguito ai controlli fatti mi è stata diagnosticata una malattia che mi porterà, un giorno, alla perdita della visione centrale.

Ecco il mio Capolinea. Sperando che il viaggio verso quella tappa sia ancora lungo, ho provato a simulare quello che probabilmente accadrà. I primi sintomi, la certezza, la malattia, la rabbia, l'adattamento, la ripartenza.

IPO-VISIONE è il tentativo di raccontare con le immagini ciò che presumibilmente accadrà, a chi è stata diagnosticata la maculopatia.

E' un modo per prendere confidenza con il problema, che va dalla percezione dei colori in modo meno intenso, alla percezione delle righe in modo distorto, fino alla perdita della visione centrale.

IPO-Visione però non si ferma al capolinea della perdita della visione centrale, ma riparte, adottando strategie per adattarsi alla nuova situazione




TEST DI AMSLER

Il test per scoprire precocemente la **MACULOPATIA** è il test di **AMSLER**. Il sintomo tipico della maculopatia è la **METAMORFOSIA** che consiste in una visione distorta delle linee.

COME SI ESIGUE IL TEST DI AMSLER?

1. stampare questa pagina senza ridimensionare il formato in fase di stampa (formato A4)
2. se necessario indossare gli occhiali per leggere
3. tenere la griglia ad una distanza di 30 - 40 centimetri
4. coprire con il palmo della mano l'occhio sinistro
5. tenere con la mano destra il test alla normale distanza di lettura
6. fissare con l'occhio destro il punto al centro della griglia
7. fare attenzione se si osservano le righe *deformate, distorte, spezzate*; oppure se è presente una *macchia scura*
8. ripetere la stessa procedura per l'altro occhio



Se una qualsiasi zona della griglia appare ondulata, sfocata o scura contattare immediatamente il vostro oculista di fiducia.



